

Số: 278/BC-CCTTBVT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng

(Từ ngày 13 tháng 03 năm 2024 đến ngày 19 tháng 3 năm 2024)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23°C - 26°C, nhiệt độ cao nhất từ 34°C - 37°C.

Dự báo tuần tới: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ trung bình từ: 28,5°C - 29,5°C. Giá trị tổng lượng mưa <5 mm.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa vụ Đông xuân 2023 – 2024

STT	Giai đoạn sinh trưởng	Diện tích gieo trồng (ha)
1	Mạ	-
2	Đẻ nhánh	30,0
3	Làm đồng	35,0
4	Trổ	5,0
5	Chín	888,0
6	Thu hoạch	3.299,0
	Tổng	4.257,0

b) Cây trồng khác

Nhóm/loại cây	Giai đoạn sinh trưởng	DTGT (ha)	Nhóm/loại cây	Giai đoạn sinh trưởng	DTGT (ha)
1. Cây rau vụ Đông xuân 2023 - 2024		7.895,6	2. Hoa, cây kiểng	Nhiều giai đoạn	1.742
- RALNN	Nhiều giai đoạn	2.021,2	Hoa lan	Nhiều giai đoạn	305
- RALDN	-	-	Hoa mai	Nhiều giai đoạn	810
- RCQNN	Nhiều giai đoạn	653,5	3. Cây lương thực		438,4
- RCQDN	Nhiều giai đoạn	551,6	Bắp	Thu hoạch	409,1
- Rau gia vị	Nhiều giai đoạn	267,8	Khoai mì	Sinh trưởng	27,2
- Rau thủy sinh	Nhiều giai đoạn	223,6	4. Cây công nghiệp		1.460,8
- RMN	Nhiều giai đoạn	2.208,7			

Ghi chú: DTGT: Diện tích gieo trồng; RALNN: Rau ăn lá ngắn ngày; RALDN: Rau ăn lá dài ngày; RCQNN: Rau củ quả ngắn ngày; RCQDN: Rau củ quả dài ngày; RMN: Rau muống nước;

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT SINH VẬT GÂY HẠI CHỦ YẾU

1. Số liệu theo dõi rầy nâu vào bẫy đèn trên lúa (con/bẫy/đêm)

TT	HUYỆN	Xã	Ngày vào đèn						
			12/3	13/3	14/3	15/3	16/3	17/3	18/3
1	Củ Chi	Thái Mỹ	36	39	27	38	26	25	29
		Trung Lập Thượng	15	6	18	16	20	24	-

III. TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI CHỦ YẾU

1. Mật độ, tỷ lệ sinh vật gây hại chủ yếu

a) Trên cây lúa vụ Đông xuân 2023 - 2024

TT	Tên SVGH	Mật độ sâu (c/m ²), tỷ lệ bệnh (%)			Tuổi sâu, cấp bệnh phổ biến	Phân bố
		Phổ biến	Cao	Cục bộ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bọ xít hôi	3-6			T1-3	CC
2	OBV	2-4			Các giai đoạn	HM,BT
3	Chuột	3-5			Các giai đoạn	BT, HM
4	Đạo ôn	5-10%			C1-C3	BT

b) Trên cây rau

TT	Tên SVGH	Mật độ sâu (c/m ²), tỷ lệ bệnh (%)			Tuổi sâu, cấp bệnh phổ biến	Phân bố
		Phổ biến	Cao	Cục bộ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bọ nhảy	10-20			1-5	HM, Q12, BC, BT
2	Sâu xanh	5-10			1-5	HM, Q12, BC, BT, CC
3	Sâu tơ	10-25			1-5	HM, Q12, BC, BT, TĐ
4	Dòi đục lá	15-30%			1-5	HM, CC
5	Sâu đục trái	5-10%			1-5	BC
6	Sâu ăn tạp	3-10			1-5	TĐ, HM, Q12, BC, BT, CC
7	Bọ trĩ	15-30%			1-5	BC, CC
8	Rầy mềm	15-30%			1-5	BC, BT
9	Rầy xanh	3-7			1-5	BC, HM, CC
10	Rầy xám	100->500			1-5	HM, Q12, TĐ
11	Bọ phấn	2-10			1-5	CC
12	Sâu đục đọt	5-10			1-5	BC
13	Bọ xít đen	5-10			1-5	TĐ
14	Ruồi đục trái	5-10%			1-5	BC, CC
15	OBV	3-30			Các giai đoạn	TĐ, HM, Q12

c) Cây trồng khác

- Cây bắp: Chưa ghi nhận diện tích bị sâu keo mùa thu (*Spodoptera frugiperda*) gây hại trên cây bắp.
- Cây khoai mì: Chưa ghi nhận diện tích trồng khoai mì bị nhiễm bệnh khảm lá.
- Cây dừa: Chưa ghi nhận diện tích bị sâu đầu đen (*Opisina arenosella*) gây hại trên cây dừa.

IV. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ

1. Dự báo sinh vật gây hại chủ yếu trong kỳ tới

a) Cây lúa

- Rầy nâu: Rầy nâu ngoài đồng phổ biến ở giai đoạn tuổi 3 - 4 với mật số thấp. Khuyến cáo nông dân thăm đồng thường xuyên, theo dõi sát diễn biến của rầy trên đồng để có biện pháp quản lý hiệu quả đối tượng này.
- Chú ý bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa giai đoạn trổ - chín; chuột gây hại trên lúa giai đoạn đồng - trổ - chín.
- Các đối tượng khác xuất hiện gây hại với tỷ lệ và mật số không cao.

b) Cây rau

- Rau ăn lá: Cần chú ý các loài sâu hại phổ biến như bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, rầy xám, bọ trĩ. Ngoài ra cần chú ý phòng trị một số bệnh như bệnh gỉ trắng trên cây rau muống, bệnh đốm lá, vàng lá.
- Rau ăn quả: Lưu ý các sinh vật hại phổ biến như sâu ăn tạp, sâu xanh, ruồi đục trái, rầy mềm, đốm lá, vàng lá.

c) Cây trồng khác

Cây dừa: lưu ý các đối tượng như bọ cánh cứng, bọ vòi voi, sâu đầu đen.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý đến bệnh rụng lá đốm tròn trên cây cao su; bệnh Greening, và sâu đục trái trên cây có múi; Sâu đục thân, rệp sáp, rầy đầu vàng trên các ruộng mía giai đoạn đẻ nhánh tích cực và vươn lóng.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ sinh vật gây hại chủ yếu trong kỳ tới

- Theo dõi diễn biến sinh vật gây hại trên đồng ruộng và tình hình sản xuất cây trồng vụ Đông xuân 2023 - 2024.
- Thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật theo dõi, bám sát đồng ruộng, điều tra nắm bắt kịp thời tình hình sinh vật hại để phòng trị kịp thời, tránh sâu hại lây lan và gây hại trên diện rộng, ảnh hưởng đến năng suất.
- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 5957/CT-BNN-BVTV ngày 06/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn.
- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 9864/CT-BNN-BVTV ngày 19/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất.

TT	Tên SVGH	Mật độ sâu (c/m ²), tỷ lệ bệnh (%)			Tuổi sâu, cấp bệnh phổ biến	Phân bố
		Phổ biến	Cao	Cực bộ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	Ốc sên	3-6			Các giai đoạn	Q12,BC
17	Tnhũn/r.cải	5-10%			1-3	HM,Q12,BC
18	Rỉ trắng/RM	2-5%			1-3	TĐ,HM,Q12,BC,BT,CC
19	Đốm lá	5-10%			1-3	BC,HM,Q12
20	Ph.vàng/dưa leo, khổ qua	5-7			1-3	HM
21	Vàng lá	2-10			1-3	TĐ,HM

2. Nhận xét tình hình sinh vật gây hại trong kỳ

a) Cây lúa vụ Đông xuân 2023 - 2024: Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên lúa là 136,2 ha, giảm 283,1 ha so với tuần trước. Diện tích nhiễm tập trung tại huyện Hóc Môn với sinh vật hại chủ yếu là ốc bươu vàng, ở mức nhiễm nhẹ.

b) Cây rau

Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên cây rau vụ Đông xuân 2023 - 2024 trong tuần qua 616,0 ha, giảm 27,8 ha so với tuần trước. Trong đó diện tích phòng trừ là 375,8 lượt ha, chiếm 61,0% diện tích nhiễm sinh vật hại. Các sinh vật hại chủ yếu là sâu ăn tạp, sâu xanh, dòi đục lá, bọ nhảy, rầy xám, ốc bươu vàng, bệnh rỉ trắng, bệnh thối nhũn. Các sinh vật hại đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu ăn tạp: Diện tích 116,9 ha, giảm 11,3 ha so với tuần trước. Phân bố chủ yếu ở huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Quận 12.

- Sâu xanh: Diện tích 68,5 ha, giảm 2,6 ha so với tuần trước. Phân bố chủ yếu ở huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh.

- Bọ trĩ: Diện tích nhiễm 31,6 ha, giảm 6,0 ha so với tuần trước. Phân bố chủ yếu ở huyện Củ Chi.

- Dòi đục lá: Diện tích nhiễm 26,4 ha, giảm 3,0 ha so với tuần trước. Phân bố chủ yếu ở huyện Củ Chi.

- Rầy xanh: Diện tích nhiễm 21,9 ha, giảm 3,8 ha so với tuần trước. Phân bố chủ yếu ở huyện Củ Chi.

- Bọ nhảy: Diện tích nhiễm 22,6 ha, tăng 0,9 ha so với tuần trước. Phân bố chủ yếu ở huyện Hóc Môn, Quận 12, Bình Chánh.

- Ốc bươu vàng: Diện tích nhiễm 208,6 ha, tương đương so với tuần trước. Phân bố chủ yếu ở huyện Hóc Môn, Quận 12, thành phố Thủ Đức.

- Bệnh rỉ trắng: Diện tích 29,4 ha, giảm 1,0 ha so với tuần trước. Phân bố chủ yếu ở huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Quận 12, thành phố Thủ Đức.

- Bệnh vàng lá: Diện tích 6,0 ha, giảm 0,1 ha so với tuần trước. Phân bố chủ yếu ở huyện Hóc Môn, Bình Chánh.

- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 4962/BNN-BVTV ngày 15/7/2019 của Bộ trưởng về tăng cường chỉ đạo phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô, giám sát Phòng chống hiện tượng lùn xoắn lá ngô; Theo dõi chặt chẽ diễn biến của sâu keo mùa thu hại ngô, áp dụng Quy trình kỹ thuật phòng, chống sâu keo mùa thu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020.

- Trên nhóm cây có múi áp dụng các biện pháp quản lý trong quy trình phòng trừ bệnh greening và sâu đục trái cây có múi đã được ban hành. Khuyến cáo áp dụng biện pháp bao trái để phòng ngừa sâu đục trái gây hại./. *Tea*

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV Phía Nam;
- Sở NN và PTNT (phòng KHCN);
- UBND TP.Thủ Đức;
- UBND huyện: CC, HM, BC, NB, CG;
- UBND Quận: 7, 12, Bình Tân;
- Chi cục TTBVTV các tỉnh phía Nam;
- Hội Nông dân Thành phố;
- Trung tâm Khuyến nông;
- Ban lãnh đạo Chi Cục;
- Phòng: BVTV, TT;
- Trạm TTBVTV;
- Lưu: VT, BVTV.ĐTH (02).

**KT.CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**



Trương Công Lực

Phụ lục II

TỔNG HỢP DIỆN TÍCH NHIỆM SINH VẬT GÂY HẠI CHỦ YẾU TRÊN CÂY RAU

(Kèm theo Báo cáo số: ~~278~~/BC-CCTTBVTV, ngày ~~21~~ tháng 9 năm 2024 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật)

STT	Tên SVGH	Diện tích nhiễm (ha)			Tổng DTN (ha)	So sánh DTN (+/-)		DT phòng trừ (ha)	Phân bố
		Nhệ-Tb	Nặng	MT		Kỳ trước	CKNT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Bọ nhảy	22,6			22,6	21,7	24,4	16,3	HM, Q12,BC,BT
2	Sâu xanh	68,5			68,5	71,1	62,3	47,8	HM,Q12,BC,BT,CC
3	Sâu tơ	17,5			17,5	18,3	17,1	11,2	HM,Q12,BC,BT,TĐ
4	Dòi đục lá	26,4			26,4	29,4	16,4	14,2	HM,CC
5	Sâu đục trái	1,8			1,8	1,8	1,8	1,8	BC
6	Sâu ăn tạp	116,9			116,9	128,2	122,7	81,0	TĐ,HM,Q12,BC,BT,CC
7	Bọ trĩ	31,6			31,6	37,6	15,8	19,6	BC,CC
8	Rầy mềm	1,1			1,1	1,1	1,3	1,0	BC,BT
9	Rầy xanh	21,9			21,9	25,7	16,9	11,5	BC,HM,CC
10	Rầy xám	14,8			14,8	14,8	20,2	7,8	HM,Q12,TĐ
11	Bọ phấn	15,0			15,0	15,0	11,0	9,0	CC
12	Sâu đục đọt	0,7			0,7	0,7	1,1	0,7	BC
13	Bọ xít đen	4,0			4,0	4,0	4,0	-	TĐ
14	Ruồi đục trái	18,9			18,9	18,8	18,6	11,9	BC,CC
15	OBV	208,6			208,6	208,6	208,5	110,1	TĐ,HM,Q12
16	Ôc sên	0,60			0,60	0,6	0,60	0,5	Q12,BC
17	Tnhũn/r.cài	3,9			3,9	4,6	6,4	2,5	HM,Q12,BC
18	Ri trắng/RM	29,4			29,4	30,4	33,8	21,2	TĐ,HM,Q12,BC,BT,CC
19	Đóm lá	5,2			5,2	4,9	9,7	3,8	BC,HM,Q12
20	Ph.vàng/dưa leo, khổ qua	0,6			0,6	0,4	0,5	0,4	HM
21	Vàng lá	6,0			6,0	6,1	7,0	3,5	TĐ,HM
	Tổng	616,0			616,0	643,8	600,1	375,8	

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

Phụ lục I

TỔNG HỢP DIỆN TÍCH NHIỆM SVGH CHỦ YẾU TRÊN CÂY LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN 2023 - 2024

(Kèm theo Báo cáo số: **47**/BC-CCTBVTV, ngày **21** tháng **9** năm 2024 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật)

STT	Tên SVGH	Diện tích nhiệm (ha)			Tổng DTN (ha)	So sánh DTN (+/-)		DT phòng trừ (ha)	Phân bố
		Nhệ-Tb	Nặng	MT		Kỳ trước	CKNT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Sâu cuốn lá	-			-	5	-	-	
2	Bọ xít hôi	6			6	6	5,4		CC
4	Đạo ôn	1			1	7	3,5		BT
5	Đốm vằn	-			-	4	-		-
6	OBV	128			128	387	517		HM,BT
7	Chuột	1,2			1,2	10,3	2,5		HM,BT
8	Vàng lá	-			-	-	1		-
9	Lem lép hạt	-			-	-	0,2		-
	Tổng	136,2			136,2	419,3	529,6		

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT