

Số: /BC-CCBVTV-BVKDTV Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2026

## BÁO CÁO

Tình hình sản xuất và sinh vật gây hại cây trồng  
(Từ ngày 27 tháng 5 năm 2026 đến ngày 02 tháng 6 năm 2026)

### I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

#### 1. Thời tiết

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24°C - 26°C, cao nhất 30°C - 32°C.

Dự báo tuần tới: chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ trung bình từ 29,0°C - 30,0°C. Giá trị tổng lượng mưa phổ biến 40 - 70 mm.

#### 2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) **Cây lúa vụ Hè thu 2026:** Diện tích đã xuống giống là 7.463,9 ha. Trong đó, diện tích lúa giai đoạn mạ là 2.842,5 ha (chiếm 38,1% diện tích gieo trồng), giai đoạn đẻ nhánh là 4.199,4 ha (chiếm 56,3% diện tích gieo trồng), giai đoạn làm đòng là 330,0 ha (chiếm 4,4% diện tích gieo trồng), giai đoạn trổ là 69,0 ha (chiếm 0,9% diện tích gieo trồng) và 23 ha lúa giai đoạn chín (chiếm 0,3% diện tích gieo trồng).

Cụ thể như sau:

STT	Giai đoạn sinh trưởng	Diện tích gieo trồng (ha)	Ghi chú
1	Mạ	2.842,5	
2	Đẻ nhánh	4.199,4	
3	Làm đòng	330,0	
4	Trổ	69,0	
5	Chín	23,0	
6	Thu hoạch	-	
	<b>Tổng</b>	<b>7.463,9</b>	

#### b) Cây công nghiệp và cây ăn trái

STT	Nhóm/loại cây	Giai đoạn sinh trưởng	Diện tích gieo trồng (ha)
1	<b>Cây công nghiệp</b>		
	Cao su	Nhiều giai đoạn	154.133

STT	Nhóm/loại cây	Giai đoạn sinh trưởng	Diện tích gieo trồng (ha)
	Cây tiêu	Nhiều giai đoạn	10.746
	Cây điều	Nhiều giai đoạn	7.500
	Cây cà phê	Nhiều giai đoạn	2.600
	Khoai mì (vụ Đông xuân 2025 – 2026)	Thu hoạch	7.372,0
	Khoai mì (vụ Hè thu 2026)	Phát triển thân lá	1.028,0
2	<b>Cây ăn trái</b>		
	Cây chuối	Nhiều giai đoạn	4.610
	Cây bưởi	Nhiều giai đoạn	4.090
	Cây nhãn	Nhiều giai đoạn	2.015
	Cây sầu riêng	Nhiều giai đoạn	2.630
	Cây xoài	Nhiều giai đoạn	1.566
	Cây mít	Nhiều giai đoạn	1.830

### c) Cây rau vụ, cây hoa kiểng và cây lương thực

STT	Nhóm/loại cây	Giai đoạn sinh trưởng	Diện tích gieo trồng (ha)
1	<b>Cây rau các loại</b> (vụ Hè Thu 2026)	Nhiều giai đoạn	5.553,3
2	<b>Đậu các loại</b> (vụ Đông xuân 2025 - 2026)	Nuôi trái - Thu hoạch	368,0
	<b>Đậu các loại</b> (vụ Hè thu 2026)	Mới xuống giống	167,1
3	<b>Cây lương thực</b>		
	Bắp (vụ Đông xuân 2025 - 2026)	Nhiều giai đoạn	1.912,0
	Bắp (vụ Hè thu 2026)	Phát triển thân lá	1.713,9
4	<b>Cây hoa kiểng</b>		
	Hoa lan	Nhiều giai đoạn	300,0
	Hoa mai	Nhiều giai đoạn	810,0

### 3. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng của dịch hại

Không có diện tích cây trồng bị ảnh hưởng của dịch hại.

## II. TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI CHỦ YẾU

**1. Cây lúa vụ Hè thu 2026:** Tổng diện tích nhiễm sinh vật gây hại trên cây lúa trong tuần là 526,5 ha (giảm 3,7 ha so với tuần trước) chủ yếu là bọ trĩ, sâu phao, ốc bươu vàng và chuột. Các sinh vật hại đều có mật số ở mức nhiễm nhẹ.

+ Bọ trĩ: Diện tích nhiễm 95,5 ha (giảm 71,2 ha so với tuần trước). Phân bố chủ yếu ở các xã An Nhơn Tây, Củ Chi, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Tân An Hội và Thái Mỹ.

+ Sâu phao: Diện tích nhiễm 121,0 ha (tăng 55,0 ha so với tuần trước). Phân bố chủ yếu ở các xã An Nhơn Tây, Củ Chi, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Tân An Hội và Thái Mỹ.

+ Ốc bươu vàng: Diện tích nhiễm 162,0 ha (giảm 4,0 ha so với tuần trước). Phân bố chủ yếu ở các xã An Nhơn Tây, Củ Chi, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Tân An Hội, Thái Mỹ, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Hồ Tràm và Đất đỏ.

+ Chuột: Diện tích nhiễm 120,0 ha (giảm 2,0 ha so với tuần trước). Phân bố chủ yếu ở các xã An Nhơn Tây, Củ Chi, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Tân An Hội và Thái Mỹ.

*(Chi tiết diện tích nhiễm tại Phụ lục)*

## **2. Cây công nghiệp và cây ăn trái**

- Cây cao su: Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trong tuần là 23,8 ha (tăng 4,0 ha so với tuần trước), chủ yếu bệnh bệnh đốm lá, khô miệng cạo và bệnh xì mù.

+ Bệnh đốm lá: Diện tích nhiễm 13,0 ha (tăng 4,0 ha so với tuần trước), phân bố chủ yếu tại các xã Chánh Hiệp, Tây Nam, Trừ Văn Thố, Minh Thạnh và Long Hòa.

+ Bệnh xì mù: Diện tích nhiễm 7,6 ha (tương đương so với tuần trước), phân bố chủ yếu tại các xã Chánh Hiệp, Tây Nam, Trừ Văn Thố và Bàu Bàng.

+ Bệnh khô miệng cạo: Diện tích nhiễm 3,2 ha (tương đương so với tuần trước), phát sinh mới trong tuần, phân bố chủ yếu tại các xã Thường Tân, Bình Cơ, Bắc Tân Uyên, An Long, Phước Thành, Phước Hòa và Phú Giáo.

- Cây tiêu: Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trong tuần là 7,0 ha (tương đương so với tuần trước chủ yếu bệnh chết chậm. Phân bố chủ yếu tại các xã Bắc Tân Uyên, Phước Thành, Phước Hòa, Phú Giáo và Bình Giã.

- Cây điều: Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trong tuần là 6,0 ha (tương đương so với tuần trước), chủ yếu là bệnh thán thư và bọ xít muỗi. Phân bố chủ yếu tại các xã Bắc Tân Uyên, Phước Thành, Phước Hòa, Phú Giáo và Xuân Sơn.

- Cây khoai mì vụ Hè thu 2026: Tổng diện tích nhiễm bệnh khảm lá trong tuần là 18,0 ha (tăng 3,0 ha so với tuần trước). Toàn bộ diện tích nhiễm nhẹ. Phân bố chủ yếu ở các xã Tây Nam, Long Nguyên, Chánh Phú Hòa Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Minh Thạnh, Long Hòa, Dầu Tiếng và Thanh An.

- Cây có múi: Tổng diện tích nhiễm sinh vật gây hại trong tuần là 185,8 ha (giảm 68,2 ha so với tuần trước) chủ yếu sâu vẽ bùa, ruồi đục quả, nhện đỏ, bọ trĩ và bệnh thán thư.

+ Sâu vẽ bùa: Diện tích nhiễm 27,3 ha (giảm 18,9 ha so với tuần trước), phân bố chủ yếu ở các xã Thủ Dầu Một, Bến Cát, Phú An, Long Nguyên, Minh Thạnh, Long Hòa, Dầu Tiếng, Tân Uyên, Thường Tân, Bắc Tân Uyên, An Long, Phước Thành, Phước Hoà và Phú Giáo.

+ Ruồi đục quả: Diện tích nhiễm 19,3 ha (tương đương so với tuần trước), phân bố chủ yếu ở các xã Long Nguyên, Trừ Văn Thố, Long Hòa, Tân Uyên, Thường Tân, Bắc Tân Uyên, An Long, Phước Thành, Phước Hoà và Phú Giáo.

+ Nhện đỏ: Diện tích nhiễm 28,0 ha (giảm 9,5 ha so với tuần trước), phân bố chủ yếu ở các xã Thủ Dầu Một, Bến Cát, Phú An, Chánh Phú Hòa, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Minh Thạnh, Long Hòa, Dầu Tiếng, Tân Uyên, Thường Tân, Bắc Tân Uyên, Phước Thành, Phước Hoà, Phú Giáo và Tân Thành.

+ Bọ trĩ: Diện tích nhiễm 17,0 ha (giảm 11,5 ha so với tuần trước), phân bố chủ yếu ở các xã Tân An Hội, Thái Mỹ, Long Hòa, Dầu Tiếng, Tân Uyên, Thường Tân, Bắc Tân Uyên, Phước Thành, Phước Hoà, Phú Giáo và Tân Thành.

+ Bệnh thán thư: Diện tích nhiễm 19,0 ha (tương đương so với tuần trước), phân bố chủ yếu ở các xã Bến Cát, Minh Thạnh, Long Hòa, Dầu Tiêng, Tân Uyên, Thường Tân, Bình Cơ, Bắc Tân Uyên, Phước Thành, Phước Hoà, Phú Giáo và Tân Thành.

- Cây chuối: Diện tích nhiễm là 21,0 ha (tương đương so với tuần trước), chủ yếu là bệnh đốm lá (Sigatoka).

+ Bệnh đốm lá: Diện tích nhiễm 14,0 ha (tương đương so với tuần trước), phân bố chủ yếu tại các xã Thường Tân, Bắc Tân Uyên, An Long, Phước Thành, Phước Hoà và Phú Giáo.

*(Chi tiết diện tích nhiễm tại Phụ lục)*

### **3. Cây rau và cây hoa kiểng**

- Cây rau: Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên cây rau vụ hè thu trong tuần là 269,9 ha (giảm 22,2 ha so với tuần trước). Trong đó diện tích phòng trừ là 135,2 ha, chiếm 50,1% diện tích nhiễm sinh vật gây hại. Các sinh vật hại đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

+ Diện tích nhiễm sinh vật hại trên nhóm rau họ thập tự là 98,8 ha (giảm 2,2 ha so với tuần trước). Các sinh vật gây hại chủ yếu là bọ nhảy, sâu xanh bướm trắng, sâu khoang, sâu tơ, rầy mềm, ...

+ Diện tích nhiễm sinh vật hại trên nhóm rau họ bầu bí là 87,2 ha (giảm 15,0 ha so với tuần trước). Các sinh vật gây hại chủ yếu là sâu xanh hai sọc trắng, bọ trĩ, rầy mềm, bệnh giả sương mai, ...

+ Diện tích nhiễm sinh vật hại trên nhóm rau họ bìm bìm là 70,4 ha (giảm 5,0 ha so với tuần trước). Các sinh vật gây hại chủ yếu là sâu khoang và bệnh rỉ trắng.

- Cây hoa kiểng: Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trong kỳ là 27,4 ha, (giảm 1,1 ha so với tuần trước). Diện tích phòng trừ sinh vật hại trên hoa lan, cây kiểng là 21,7 ha chiếm 79,3% diện tích nhiễm sinh vật hại. Các sinh vật hại phổ biến trên hoa lan là muỗi đục nụ, bệnh đốm vòng và thối nhũn; trên cây hoa mai là sâu ăn lá, nhện đỏ và bệnh gỉ sắt. Các sinh vật hại đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

+ Cây hoa lan: Diện tích nhiễm là 19,3 ha (giảm 1,1 ha so với tuần trước). Phân bố chủ yếu ở các xã An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Bình Chánh, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Hiệp Phước, Bến Cát, Long Nguyễn và Long Hoà.

+ Cây hoa mai: Diện tích nhiễm là 8,1 ha (tương đương so với tuần trước). Phân bố chủ yếu ở xã, phường Hiệp Bình, Bình Trưng, Bình Lợi và Tây Nam.

*(Chi tiết diện tích nhiễm tại Phụ lục)*

## **III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG KỲ TỚI**

### **1. Công tác chỉ đạo sản xuất**

- Tiếp tục kiểm tra, cập nhật tình hình, tiến độ sản xuất cây trồng trên địa bàn Thành phố, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, khí tượng thủy văn và tổ chức tốt công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo sinh vật gây hại cây trồng, để chỉ đạo sản xuất kịp thời, hiệu quả, bảo vệ an toàn sản xuất trồng trọt.

- Thực hiện tốt Công văn số 3755/TTTV-TTBVTV ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc chỉ đạo sản xuất trồng trọt ở các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long.

- Tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, sản xuất theo quy trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) để nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Đẩy mạnh áp dụng cơ giới hoá trong gieo sạ để giảm lượng giống gieo, cơ giới hoá trong bón phân, phun thuốc, thu gom rơm rạ, ...

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, dư lượng hóa chất, nhằm nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Tiếp tục thực hiện tốt Công văn số 406/BVTV-TV ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Cục Bảo vệ thực vật về việc chủ động phòng chống sinh vật gây hại cây trồng.

- Thực hiện Công văn số 8386/SNNMT-CCBVTV ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý rệp sáp vảy đỏ gây hại trên cây bưởi tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thực hiện Công văn số 9998/SNNMT-CCTL ngày 14 tháng 4 năm 2026 về việc báo cáo kết quả triển khai các giải pháp phòng chống, ứng phó hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2026 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thực hiện Công văn số 1427/TTTV-TTBVTV ngày 20 tháng 4 năm 2026 của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu, vụ Thu Đông, vụ Mùa năm 2026 các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ.

*\* Cây lúa:*

Cần triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm giá thành sản xuất, đồng thời nâng cao khả năng thích nghi với điều kiện thời tiết bất lợi như giảm lượng giống gieo sạ, giảm thuốc trừ sâu, giảm lượng phân bón phù hợp, tiết kiệm nước tưới và áp dụng các kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến.

*\* Cây rau:*

- Áp dụng biện pháp canh tác cây rau màu tùy thuộc vào điều kiện đất đai, mùa vụ, hệ thống tưới tiêu và đối tượng cây trồng.

- Tăng cường các giải pháp tưới tiết kiệm và sử dụng phân hữu cơ, bón phân cân đối. Đồng thời duy trì sản xuất an toàn thực phẩm, mở rộng diện tích sản xuất có chứng nhận an toàn.

*\* Cây công nghiệp và cây ăn quả:*

- Kiểm soát chặt chẽ diện tích dự kiến đưa vào sản xuất phù hợp với kế hoạch được phê duyệt, không để phát triển nóng các loại cây trồng không phù hợp hoặc quá tải, đặc biệt đối với những cây dễ bị tổn thương như sầu riêng, mít, cam, ...

- Tùy theo tình hình nguồn nước để bố trí rải vụ cây ăn quả hợp lý, có tính linh hoạt cao để giảm thiểu thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn và các tình huống thiên tai bất thường có thể xảy ra.

## **2. Dự báo sinh vật gây hại chủ yếu trong kỳ tới**

### **a) Cây lúa**

- Rầy nâu trên đồng phổ biến ở tuổi 3 - tuổi 4 xuất hiện với mật số thấp. Khuyến cáo nông dân thăm đồng thường xuyên, theo dõi chặt chẽ diễn biến phát sinh, phát triển của rầy nâu trên đồng để kịp thời áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp, hiệu quả.

- Đối với địa phương chuẩn bị xuống giống lúa vụ Hè thu 2026 cần chuẩn bị giống tốt, làm đất kỹ, theo dõi tình hình rầy vào đèn, khí tượng thủy văn tại địa phương để xuống giống an toàn, hạn chế thiệt hại do điều kiện thời tiết bất lợi gây ra.

- Chú ý theo dõi bọ trĩ, sâu phao, ốc bươu vàng, chuột gây hại trên các trà lúa đang ở giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

- Bệnh đạo ôn và bệnh khô vằn có khả năng phát sinh gây hại trên các trà lúa giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng, đặc biệt trong điều kiện thời tiết có nắng mưa xen kẽ, ẩm độ cao, ruộng sạ dày, bón thừa đạm, thoát nước kém.

- Các đối tượng khác xuất hiện gây hại với tỷ lệ và mật số không cao.

### **b) Cây công nghiệp và cây ăn trái**

- Cây cao su: Tăng cường kiểm tra vườn cây trong mùa mưa để phát hiện sớm bệnh khô miệng cao, loét sọc miệng cao, nấm hồng và hiện tượng nứt thân xì mù. Thực hiện vệ sinh lô cao, xử lý kịp thời bộ phận nhiễm bệnh, kết hợp chăm sóc dinh dưỡng cân đối nhằm nâng cao sức chống chịu của cây.

- Cây có múi: Mưa rào, ẩm độ cao và có nắng nóng cục bộ tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh ghẻ, vàng lá - thối rễ, loét vi khuẩn và sâu vẽ bùa phát sinh, gây hại mạnh. Khuyến cáo nông dân thăm vườn thường xuyên, áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), tăng cường sử dụng phân hữu cơ và cải thiện điều kiện vườn nhằm nâng cao sức khỏe cây và hạn chế dịch hại.

- Cây chuối: Thời tiết có mưa vào chiều và tối, ngày nắng tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh cho bệnh héo vàng lá chuối (Panama) phát sinh và gây hại trên các vườn chuối trồng ở đất thoát nước kém, giống mẫn cảm. Khuyến cáo người trồng tăng cường thăm vườn, áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp, sử dụng giống sạch bệnh và cải thiện điều kiện đất trồng nhằm hạn chế nguy cơ bệnh phát triển, lây lan.

### **c) Cây rau, hoa kiểng và cây lương thực**

- *Cây rau:*

+ Rau ăn lá: Cần chú ý các loài sâu hại phổ biến như bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, rầy xám, bọ trĩ. Ngoài ra cần chú ý phòng trị một số bệnh như bệnh gi trắng trên cây rau muống, bệnh đốm lá, vàng lá.

+ Rau ăn quả: Lưu ý các sinh vật hại phổ biến như sâu ăn tạp, sâu đục trái, sâu xanh, ruồi đục trái, rầy mềm, đốm lá, vàng lá.

- *Cây khoai mì:* tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền và tập huấn để nông dân chủ động phát hiện, quản lý bệnh khảm lá sắn theo hướng dẫn chuyên môn; hướng dẫn nhận biết triệu chứng và áp dụng biện pháp theo Công văn số 1722/BVTV-TV ngày 08 tháng 8 năm 2024 của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; áp dụng quy trình canh tác và sản xuất giống sạch bệnh theo Công văn số 622/TT-CLT ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Cục Trồng trọt; kiểm soát chặt nguồn giống, đặc biệt ở vùng có bệnh, tuyệt đối không dùng giống nhiễm bệnh cho các vụ sau.

- *Cây hoa kiểng:*

+ Cây hoa lan: cần lưu ý một số bệnh hại thường phát sinh gây hại như bệnh khô đầu lá, thối nhũn, đốm lá và một số côn trùng gây hại như nhện đỏ, muỗi đục nụ...

+ Cây hoa mai: cần lưu ý phòng trị sâu ăn lá, rầy xanh, bọ trĩ, bệnh cháy lá.

### **3. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ sinh vật gây hại chủ yếu trong kỳ tới**

- Phân công lãnh đạo, cán bộ chuyên môn bám sát cơ sở, tăng cường công tác dự tính, dự báo, thông tin tuyên truyền hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nhằm khắc phục kịp thời ảnh hưởng của thời tiết và sinh vật gây hại.

- Đẩy mạnh tuyên truyền ứng dụng các biện pháp Quản lý sức khỏe cây trồng (IPHM), IPM, “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm” trên cây lúa và các tiến bộ kỹ thuật, quy trình kỹ thuật phòng chống SVGH trên các cây trồng khác, nhất là cây có giá trị kinh tế cao.

- Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nằm trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng lúc và đúng cách để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

- Các địa phương có diện tích lúa bị chuột gây hại thực hiện hướng dẫn nông dân các biện pháp quản lý chuột theo Quy trình kỹ thuật phòng, chống chuột hại cây trồng ban hành kèm theo Công văn số 2475/BVTV-TV ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Cục Bảo vệ thực vật như phát quang bờ bụi, làm sạch cỏ ven bờ, tìm và phá ổ chuột ngay từ đầu vụ; sử dụng các bẫy cơ học (bẫy kẹp, bẫy lồng, ...), rào cản bao quanh ruộng; các loại bả, thuốc diệt chuột. Lưu ý: bả và thuốc diệt chuột phải nằm trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc ít độc hại với người, vật nuôi và môi trường. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và tuân thủ nguyên tắc 4 đúng.

- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng Quy trình Quản lý tổng hợp bệnh héo vàng lá chuối ban hành kèm theo Công văn số 424/BVTV-TV ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Cục Bảo vệ thực vật.

- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 1900/CT-BNN-BVTV ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt; Công văn số 3005/UBND-KT ngày 29 tháng 5 năm 2024 về việc thực hiện công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt trên địa bàn Thành phố; các địa phương hướng dẫn nông dân các biện pháp quản lý chuột theo Quy trình kỹ thuật phòng, chống chuột hại cây trồng ban hành kèm theo Công văn số 2475/BVTV-TV ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Cục Bảo vệ thực vật.

- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 5957/CT-BNN-BVTV ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn và Quy trình kỹ thuật quản lý tổng hợp bệnh khảm lá sắn ban hành kèm theo Công văn số 1772/BVTV-TV ngày 08 tháng 8 năm 2024 của Cục Bảo vệ thực vật./.

**Nơi nhận:**

- Trung tâm TTBVTV Phía Nam;
- UBND các xã, phường SXNN;
- Chi cục TTBVTV các tỉnh phía Nam;
- Trung tâm Khuyến nông;
- Chi cục trưởng;
- Phó CCT phụ trách;
- Phòng: BVKDTV, TT;
- Trạm TTBVTV;
- Lưu: VT, BVKDTV.ĐHiền (01).

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

**Trương Công Lực**

**Phụ lục I**

**TỔNG HỢP DIỆN TÍCH NHIỄM SINH VẬT GÂY HẠI CHỦ YẾU TRÊN CÂY LÚA VỤ HÈ THU NĂM 2026**

*(Kèm theo Báo cáo số: /BC-CCBVTV-BVKDTV ngày tháng 6 năm 2026 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật)*

STT	Tên SVGH	Mật độ sâu, tỷ lệ bệnh			Tuổi sâu, cấp bệnh phổ biến	Diện tích nhiễm (ha)			Tổng DTN (ha)	So sánh DTN (+/-)		DT phòng trừ (ha)	Phân bố
		Phổ biến	Cao	Cục bộ		Nhẹ Tb	Nặng	MT		Kỳ trước	CKNT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Rầy nâu	1.000 - 2.000 con/m <sup>2</sup>			Các tuổi	0,3			0,3				TH, TK, TT
2	Sâu đục thân	5 - 10% đánh héo			Các tuổi	3,0			3,0	3,0			PHa
3	Sâu cuốn lá	25 - 50 con/m <sup>2</sup>			Các tuổi	0,5			0,5	0,3			BĐ, XTS
4	Bọ xít đen	10 - 20 con/m <sup>2</sup>			Các tuổi	0,1			0,1				BĐ
5	Bọ trĩ	8 - 15% đánh			Các tuổi	95,5			95,5	-71,2			CC, NĐ, PHĐ, TAH, TM, HM, BĐ, XTS, TH, TK, TT
6	Sâu phao	10 - 20 con/m <sup>2</sup>			Các tuổi	121,0			121,0	55,0			ANT, CC, NĐ, PHĐ, TAH, TM
7	Ốc bươu vàng	5 - 10% lá			Các tuổi	162,0			162,0	-4,0			ANT, CC, NĐ, PHĐ, TAH, TM, HM, BĐ, XTS, TH, TK, TU, TT, HTr, ĐĐ
8	Chuột	10 - 20% đánh			Các tuổi	120,0			120,0	-2,0			ANT, CC, NĐ, PHĐ, TAH, TM
9	Bệnh đạo ôn	5 - 10% đánh			C1-C3	11,0			11,0	11,0			CC, PHĐ, TM, ĐĐ
10	Bệnh khô vằn	10 - 20% đánh			C1-C3	4,0			4,0	4,0			CC, PHĐ, TM
	<b>Tổng</b>					<b>526,5</b>			<b>526,5</b>	<b>-3,7</b>			

*Ghi chú viết tắt các xã: ANT: An Nhơn Tây, CC: Củ Chi, NĐ: Nhuận Đức, PHĐ: Phú Hòa Đông, TAH: Tân An Hội, TM: Thái Mỹ, CL: Cát Lái, XTS: Xuân Thới Sơn, BĐ: Bà Điểm, HL: Hưng Long, TN: Tân Nhựt, BL: Bình Lợi, BC: Bình Chánh, BK: Bình Khánh, ATĐ: An Thới Đông, CP: Châu Pha, Tlo: Tam Long, Pha: Phước Hải, HTr: Hồ Tràm, ĐĐ: Đất Đỏ, LD: Long Điền, LgH: Long Hương, Tthanh: Tân Thành, TH: Tân Hiệp, TK: Tân Khánh,, TU: Tân Uyên, TT: Thường Tân, TN: Tây Nam, DT: Dầu Tiếng, ThA: Thanh An*

**CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT**

**Phụ lục II**  
**TỔNG HỢP DIỆN TÍCH NHIỄM SINH VẬT GÂY HẠI CHỦ YẾU TRÊN CÂY RAU**

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-CCBVTV-BVKDTV ngày tháng 6 năm 2026 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật)

ST T	Tên SVGH	Mật độ sâu, tỷ lệ bệnh			Tuổi sâu, cấp bệnh phổ biến	Diện tích nhiễm (ha)			Tổng DTN (ha)	So sánh DTN (+/-)		DT phòng trừ (ha)	Phân bố
		Phổ biến	Cao	Cục bộ		Nhẹ-Tb	Nặng	MT		Kỳ trước	CKNT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<b>I</b>	<b>Nhóm rau họ thập tự (cải các loại)</b>					<b>98,8</b>			<b>98,8</b>	<b>-2,2</b>		<b>37,66</b>	
1	Bọ nhảy	10 -20 con/m <sup>2</sup>			Các tuổi	15,8			15,8	-1,8		6,9	CC, BC, HL, TN, VL, TVL, ĐT, HM, BĐ, XTS, ThA, ChH, TN, CPH, MT, VT, TH, TK, TU, PT, PH, PG
2	Sâu xanh bướm trắng	5 - 10 con/ m <sup>2</sup>			Các tuổi	11,3			11,3	-1,2		5,6	BM, CC, NĐ, TAH, BC, HL, TN, VL, TVL, ĐT, HM, BĐ, XTS, ChH, TN, BC, TVT, BB, MT, LgH, VT, TH, TK, TU, TT, PH, PG
3	Sâu khoang	3 - 6con/ m <sup>2</sup>			Các tuổi	13,9			13,9	1,1		5,65	CC, NĐ, PHĐ, BC, HL, TN, VL, TVL, ĐT, HM, BĐ, XTS, ThG, ChH, TN, ThH, LN, BB, LgH, DT, VT, TH, TK, TU, TT, PT, PH, PG
4	Sâu tơ	15 - 30 con/m <sup>2</sup>			Các tuổi	11,4			11,4	0,5		6,3	BC, HL, TN, VL, TVL, ĐT, HM, BĐ, XTS, ThA, BD, ChH, TDM, PL, BC, HL, LN, CPH, TVT, MT, DT, VT, TH, TU, PT, PH, PG

ST T	Tên SVGH	Mật độ sâu, tỷ lệ bệnh			Tuổi sâu, cấp bệnh phổ biến	Diện tích nhiễm (ha)			Tổng DTN (ha)	So sánh DTN (+/-)		DT phòng trừ (ha)	Phân bố
		Phổ biến	Cao	Cục bộ		Nhẹ-Tb	Nặng	MT		Kỳ trước	CKNT		
5	Ruồi đục lá	15 - 30% số lá			Các tuổi	5,6			5,6	-0,3		1,91	CC, NĐ, PHĐ, TAH, VL, TVL, ĐT, BĐ, XTS, BD, ChH, TK, PG
6	Rầy mềm	15 - 30% số cây			Các tuổi	17,9			17,9	0,1		2,6	BC, HL, TN, ThA, ThG, ChH, BC, HL, PA, LN, CPH, TVT, MT, LgH, DT, TH, TK, TU, TT, PT, PH, PG
7	Bọ trĩ	15 - 30% số cây			Các tuổi	7,4			7,4	-1,3		2,6	BC, HL, TN, BB, VT, TH, TK, TU, PT, PH, PG
8	Bệnh thối nhũn vi khuẩn	5 - 10% số cây			C1-C3	4,9			4,9	0,6		3,7	ĐT, HM, BĐ, XTS, LN, MT, VT, TH, TK, TU, PH
9	Bệnh đốm lá	15 - 30% số lá			C1-C3	8,7			8,7	0,1		2,1	BC, HL, ĐT, BĐ, XTS, BD, ChH, BC, HL, LN, TVT, DT, TH, TK, TU
10	Chết cây con	5 - 10% số cây			C1-C3	0,6			0,6				VT, TH, TK, TU
11	Khác					1,3			1,3			0,3	ThA, BD, ChH, BC, HL, CPH, BB, MT
<b>II</b>	<b>Nhóm rau họ bầu bí (đưa leo, bí đao, bầu, mướp, khổ qua, ...)</b>					<b>87,2</b>			<b>87,2</b>	<b>-15,0</b>		<b>41,9</b>	
1	Bọ dưa	2- 5con/m2			Các tuổi	4,5			4,5	0,1		1,3	BC, HL, BĐ, XTS, ThA, BC, HL, LN, CPH, VT, TH, TK, TU, PT, PH
2	Ruồi đục lá	15-30% số lá			Các tuổi	17,3			17,3	-6,0		10,6	ANT, CC, NĐ, PHĐ, TAH, TM, HL, BD, LN, VT, TK, PT, PH
3	Sâu xanh hai sọc	5-10% số			Các tuổi	20,0			20,0	-6,1		13,6	ANT, CC, NĐ, PHĐ, TAH,

ST T	Tên SVGH	Mật độ sâu, tỷ lệ bệnh			Tuổi sâu, cấp bệnh phổ biến	Diện tích nhiễm (ha)			Tổng DTN (ha)	So sánh DTN (+/-)		DT phòng trừ (ha)	Phân bố
		Phổ biến	Cao	Cục bộ		Nhẹ-Tb	Nặng	MT		Kỳ trước	CKNT		
	trắng	lá											TM, BC, HL, BÐ, XTS,
4	Rầy mềm	15-30% số cây			Các tuổi	3,7			3,7	-0,8		0,4	BC, HL, ThA, BD, TDM, PA, LN, VT, TH, TK, TU
5	Bọ trĩ	15-30% số cây			Các tuổi	24,8			24,8	-6,1		13,8	ANT, CC, NÐ, PHÐ, TAH, TM, BC, HL, TN, BÐ, XTS, BD, TDM, BC, HL, LN, VT, TH, TK, TU, AL, PT, PH, PG
6	Bệnh héo xanh	-			-	4,4			4,4	2,0			VT, TH, TK, TU, PT, PH, PG
7	Bệnh giả sương mai	10-20% số lá			C1-C3	8,4			8,4	2,1		1,9	BC, HL, BÐ, XTS, ThA, TDM, BC, PA, LN, CPH, VT, TH, TK, TU, AL, PT, PH, PG
8	Bệnh phấn trắng	10-20% số lá			C1-C3	2,5			2,5			0,1	BC, HL, VT, TH, TK, TU, PT
9	Khác					1,6			1,6	-0,2		0,2	BÐ, XTS, VT, TH, TK, TU, PT, PG
<b>III</b>	<b>Nhóm họ cà (cà chua, cà tím, ớt)</b>					<b>13,5</b>			<b>13,5</b>			<b>0,5</b>	
1	Sâu xanh	5-10 con/m <sup>2</sup>			Các tuổi	0,8			0,8				VT, TH, TK, TU, AL, PT, PH, PG
2	Sâu khoang	5-10 con/m <sup>2</sup>			Các tuổi	0,9			0,9	-0,1		0,3	BÐ, XTS, VT, TH, TK, PT
3	Ruồi đục lá	15-30% số lá			C1-C3	0,3			0,3				VT, TH, TK
4	Rầy mềm	15-30% số cây			Các tuổi	0,7			0,7				VT, TH, TK, TU, PG
5	Bọ trĩ	15-30% số cây			Các tuổi	7,4			7,4	0,1		0,2	BÐ, XTS, VT, TH, TK, TU, PT, PH, BG
6	Bệnh héo xanh	2-5% số cây			C1-C3	3,4			3,4				VT, TH, TK, TU, PT, PH, PG, NgG

ST T	Tên SVGH	Mật độ sâu, tỷ lệ bệnh			Tuổi sâu, cấp bệnh phổ biến	Diện tích nhiễm (ha)			Tổng DTN (ha)	So sánh DTN (+/-)		DT phòng trừ (ha)	Phân bố
		Phổ biến	Cao	Cục bộ		Nhẹ-Tb	Nặng	MT		Kỳ trước	CKNT		
IV	Họ bìm bìm (rau muống nước)					70,4			70,4	-5,0		55,1	
1	Rầy xám	10 - 20 con/m <sup>2</sup>			Các tuổi	1,8			1,8	-0,2		1,4	BC, VL, ĐT, HM, XTS
2	Sâu khoang	10 -20 con/m <sup>2</sup>			Các tuổi	39,5			39,5	-2,8		31,3	BM, TA, HL, ĐT, HM, XTS, TH, TK
3	Rỉ trắng/RM	10 - 20% số lá			C1-C3	25,8			25,8	-2,1		20	BM, TA, BC, HL, TVL, ĐT, TH, TK, TU
4	Ốc sên	3 - 6 con/m <sup>2</sup>			Các tuổi	0,2			0,2				TH, TU
5	Khác					3,1			3,1	0,1		2,4	ĐT, HM, XTS
	<b>TỔNG</b>					<b>269,9</b>			<b>269,9</b>	<b>-22,2</b>		<b>135,2</b>	

**Ghi chú viết tắt các xã/phường:** ANT: An Nhơn Tây, BM: Bình Mỹ, CC: Củ Chi, ND: Nhuận Đức, PHĐ: Phú Hòa Đông, TAH: Tân An Hội, TM: Thái Mỹ, ĐHT: Đông Hưng Thuận, TMT: Trung Mỹ Tây, TTH: Tân Thới Hiệp, TA: Thới An, APĐ: An Phú Đông, B: Hiệp Bình, TB: Tam Bình, TĐ: Thủ Đức, LX: Linh Xuân, LB: Long Bình, PL: Phước Long, LP: Long Phước, LT: Long Trường, BT: Bình Trưng, CL: Cát Lái, BC: Bình Chánh, HL: Hưng Long, Tn, Tân Nhựt, VL: Vĩnh Lộc, TVL: Tân Vĩnh Lộc, BL: Bình Lợi, BH: Bình Hưng, ĐT: Đông Thạnh, HM: Hóc Môn, BD: Bà Điểm, XTS: Xuân Thới Sơn, TT: Tân Tạo, ThA: Thuận An, TG: Thuận Giao, BD: Bình Dương, ChH: Chánh Hiệp, TDM: Thủ Dầu Một, PL: Phú Lợi, TN: Tây Nam, BCI: Bến Cát, ThH: Thới Hòa, HLo: Hòa Lợi, PA: Phú An, LN: Long Nguyên, CPH: Chánh Phú Hòa, TVT: Trừ Văn Thố, BB: Bà Bàng, MT: Minh Thạnh, LH: Long Hòa, DT: Dầu Tiếng, ThA1: Thanh An, DA: Dĩ An, TĐH: Tân Đông Hiệp, ĐH: Đông Hòa, AP: An Phú, LT: Lái Thiêu, BH: Bình Hòa, VT: Vĩnh Tân, TH: Tân Hiệp, TK: Tân Khánh, TU: Tân Uyên, BTU: Bắc Tân Uyên, AL: An Long, PhT: Phước Thành, PH: Phước Hòa, PG: Phú Giáo, CP: Châu Pha, TLo: Tam Long, PHa: Phước Hải, HTr: Hồ Tràm, ĐĐ: Đất Đỏ, LĐ: Long Điền, LgH: Long Hương, Tthanh: Tân Thành, THa: Tân Hải

## CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

**Phụ lục III**

**TỔNG HỢP DIỆN TÍCH NHIỄM SVGH CHỦ YẾU TRÊN CÁC CÂY TRỒNG KHÁC**

*(Kèm theo Báo cáo số: /BC-CCBVTV-BVKDTV, ngày tháng 6 năm 2026 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật)*

STT	Tên SVGH	Mật độ sâu, tỷ lệ bệnh			Tuổi sâu, cấp bệnh phổ biến	Diện tích nhiễm (ha)			Tổng DTN (ha)	So sánh DTN (+/-)		DT phòng trừ (ha)	Phân bố
		Phổ biến	Cao	Cục bộ		Nhẹ-Tb	Nặng	MT		Kỳ trước	CKNT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<b>I</b>	<b>Cây bắp</b>					<b>4,0</b>			<b>4,0</b>				
1	Sâu keo mùa thu					4,0			4,0				NT
<b>II</b>	<b>Cây khoai mì</b>					<b>18,0</b>			<b>18,0</b>	<b>3,0</b>			
1	Bệnh khảm lá	5 - 15% cây			C1-C3	18,0			18,0	3,0			TN, LN, CPH, TVT, BB, MT, LgH, DT, ThA
<b>III</b>	<b>Cây có múi</b>					<b>185,8</b>			<b>185,8</b>	<b>-68,2</b>			
1	Sâu vẽ bùa	10 - 20% lá			Các tuổi	27,3			27,3	-18,9			ThA, TDM, BC, ThH, HL, PA, LN, TVT, BB, MT, LgH, DT, TU, TT, BC, BTU, AL, PT, PH, PG
2	Ruồi đục quả	2 - 5% quả			Các tuổi	19,3			19,3				TDM, TN, BC, HL, LN, CPH, TVT, BB, LgH, DT, TU, TT, BTU, AL, PT, PH, PG
3	Sâu đục quả	2 - 5% quả			Các tuổi	16,0			16,0				TN, BC, LN, BB, MT, LgH, TU, TT, BTU, PH, PG
4	Rệp sáp, vảy	5 - 10% cành lá			Các tuổi	12,2			12,2	-22,5			TN, LN, TVT, BB, MT, LgH, DT, ThA, TU, TT, BC, BTU, AL, PT, PH, PG
5	Rệp kim	5 - 10%			Các tuổi	9,5			9,5	-6,5			TVT, BB, MT, TU, TT, BTU, AL, PT, PH, PG
6	Nhện đỏ	1 - 3%			Các tuổi	28,0			28,0	-9,5			TDM, TN, BC, PA, LN, CPH, TVT, BB, MT, LgH, DT, ThA, TU, TT, BC, BTU, AL, PT, PH, PG

STT	Tên SVGH	Mật độ sâu, tỷ lệ bệnh			Tuổi sâu, cấp bệnh phổ biến	Diện tích nhiễm (ha)			Tổng DTN (ha)	So sánh DTN (+/-)		DT phòng trừ (ha)	Phân bố
		Phổ biến	Cao	Cục bộ		Nhẹ-Tb	Nặng	MT		Kỳ trước	CKNT		
7	Bọ trĩ	10 - 20% lá			Các tuổi	17,0			17,0	-11,5			HL, PA, LN, LgH, DT, TU, TT, BC, BTU, PT, PH, PG
8	Bệnh vàng lá thối rễ	10 - 20% lá			C1-C3	8,5			8,5				PA, TVT, BB, MT, LgH, DT
9	Bệnh loét	10 - 20% lá			C1-C3	15,0			15,0	0,7			TDM, TN, LN, CPH, TVT, BB, MT, TU, TT, BTU, PH, PG
10	Bệnh sẹo	5 - 10% lá, quả			C1-C3	10,0			10,0				TN, LN, MT, DT, TU, TT, BTU, PH
11	Bệnh thán thư	5 - 10% lá, quả			C1-C3	19,0			19,0				BC, MT, LgH, DT, TU, TT, BTU, PT, PH, PG
12	Bệnh xì mũ thân	5 - 10% thân			C1-C3	4,0			4,0				TU, TT, BTU, PT
<b>IV</b>	<b>Cây chuối</b>					<b>21,0</b>			<b>21,0</b>				
1	Đóm lá (Sigatoka)	5 - 10% số lá			C1-C3	14,0			14,0				TT, BTU, AL, PT, PH, PG
2	Khác					7,0			7,0				VT, TT, BTU, AL, PT, PH, PG
<b>V</b>	<b>Cây điều</b>					<b>6,0</b>			<b>6,0</b>				
1	Bọ xít muỗi	5 - 10% số búp, quả			Các tuổi	4,0			4,0				BTU, PT, PH, PG, XS
2	Bệnh thán thư	5 - 10% số lá			C1-C3	2,0			2,0				BTU, PH, PG
<b>VI</b>	<b>Cây tiêu</b>					<b>7,0</b>			<b>7,0</b>				
1	Tuyến trùng	5 - 10% số gốc				1,0			1,0				AL, PT, PH, PG
2	Bệnh chết chậm	5 - 10% gốc, rễ, thân, lá, đọt			C1-C3	4,0			4,0				BTU, AL, PT, PH, PG, BG
3	Bệnh chết nhanh	5 - 10% thân			C1-C3	2,0			2,0				BG
<b>VII</b>	<b>Cây cao su</b>					<b>23,8</b>			<b>23,8</b>	<b>4,0</b>			
1	Bệnh xì mũ, loét sọc mặt cạo	5 - 10% thân, 10 - 25% cành, lá			C1-C3	7,6			7,6				ChH, TN, TVT, BB, VT, TT, BC, BTU, PT, PH
2	Bệnh khô miệng	5 - 10% thân			C1-C3	3,2			3,2				VT, TU, TT, BC, BTU, AL, PT,

STT	Tên SVGH	Mật độ sâu, tỷ lệ bệnh			Tuổi sâu, cấp bệnh phổ biến	Diện tích nhiễm (ha)			Tổng DTN (ha)	So sánh DTN (+/-)		DT phòng trừ (ha)	Phân bố
		Phổ biến	Cao	Cục bộ		Nhẹ-Tb	Nặng	MT		Kỳ trước	CKNT		
	cạo												PH, PG
3	Bệnh đốm lá cao su	13 - 25% cành lá			C1-C3	13,0			13,0	4,0			ChH, TN, TVT, MT, LgH

**Ghi chú viết tắt các xã/phường:** ThA: Thuận An, TG: Thuận Giao, BD: Bình Dương, ChH: Chánh Hiệp, TDM: Thủ Dầu Một, PL: Phú Lợi, TN: Tây Nam, BCI: Bến Cát, ThH: Thới Hòa, Hlo: Hòa Lợi, PA: Phú An, LN: Long Nguyên, CPH: Chánh Phú Hòa, TVT: Trừ Văn Thố, BB: Bàu Bàng, MT: Minh Thạnh, LH: Long Hòa, DT: Dầu Tiếng, ThA1: Thanh An, DA: Dĩ An, TĐH: Tân Đông Hiệp, ĐH: Đông Hòa, AP: AN Phú, LT: Lái Thiêu, BH: Bình Hòa, VT: Vĩnh Tân, TH: Tân Hiệp, TK: Tân Khánh, TU: Tân Uyên, BTU: Bắc Tân Uyên, AL: An Long, PhT: Phước Thành, PH: Phước Hòa, PG: Phú Giáo, HTr: Hồ Tràm, ĐĐ: Đất Đỏ, LD: Long Điền, Pha: Phước Hải, CP: Châu Pha, Tlo: Tam Long, Bla: Bà Lâm, LgH: Long Hương, Tthanh: Tân Thành, Hho: Hòa Hội, Hhi: Hòa Hiệp, NgG: Ngãi Giao, BG: Bình Giã, KL: Kim Long, XS: Xuân Sơn, NT: Nghĩa Thành, TP: Tân Phước,

## CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

**Phụ lục IV**

**TỔNG HỢP DIỆN TÍCH NHIỄM SVGH CHỦ YẾU TRÊN HOA LAN CÂY KIỀNG**

*(Kèm theo Báo cáo số: /BC-CCBVTV-BVKDTV, ngày tháng 6 năm 2026 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật)*

STT	Tên SVGH	Mật độ sâu, tỷ lệ bệnh			Tuổi sâu, cấp bệnh phổ biến	Diện tích nhiễm (ha)			Tổng DTN (ha)	So sánh DTN		DT phòng trừ (ha)	Phân bố
		Phổ biến	Cao	Cục bộ		Nhẹ-Tb	Nặng	MT		Kỳ trước	CKNT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<b>I</b>	<b>Hoa lan</b>					<b>19,3</b>			<b>19,3</b>	<b>-1,1</b>		<b>13,0</b>	
1	Muỗi hại bông	15 - 17% nụ hoa			Các tuổi	4,8			4,8	0,5		1,1	ANT, NĐ, TAH, TM, BC, ĐT, HM, BĐ, XTS, HP, NB, BC, LN, MT, LgH
2	Nhện đỏ	15 - 20% số cây			Các tuổi	1,3			1,3	-1,1		0,5	BC, HL, BC, LN, LgH
3	Rệp sáp vàng	15 - 17% số hoa			Các tuổi	0,06			0,06			0,04	ANT, TM
4	Bọ trĩ	3 - 5 con/cây			Các tuổi	0,7			0,7	-0,5		0,1	ANT, NĐ, TM, HL, LgH
5	Ốc sên	15 - 20% số lá			Các tuổi	3,4			3,4			0,7	BĐ, XTS, HP, NB, BC, LN, LgH
6	Bệnh đốm vòng	5 - 7% lá			C1-C3	3,2			3,2				BC, HL, ĐT, HM, BĐ, XTS, HP, NB, BC,
7	Bệnh thán thư	15 - 20% số lá			C1-C3	1,9			1,9			0,3	BC, HL, HP, NB, BC, LN, MT, LgH
8	Bệnh thối nhũn	5 - 10% lá			C1-C3	2,4			2,4			2,4	ANT, NĐ, TAH, TM,
9	Khác	-			-	1,6			1,6			0,7	ANT, NĐ, TAH, TM, BC, LN, LgH
<b>II</b>	<b>Hoa mai</b>					<b>8,1</b>			<b>8,1</b>			<b>8,7</b>	
1	Nhện đỏ	5 - 10% lá, búp			Các tuổi	1,3			1,3			0,9	BC, HL, BL, HM, BĐ, BK, CG, HP, NB, TN
2	Sâu róm	2 - 4 con/cây non			Các tuổi	0,1			0,1			0,1	BL
3	Sâu ăn lá	2 - 4 con/cành non			Các tuổi	0,9			0,9			0,7	BC, BL, BK, CG, HP, NB, TN
4	Sâu khoang	2 - 5 con/cành			Các tuổi	1,0			1,0			0,8	ANT, CC, NĐ, TAH, TM, HB, BTr, CL, HL, HM, BĐ
5	Bọ trĩ	2 - 5 con/cành			Các tuổi	1,2			1,2				BC, HL, TN, BL, HM, BĐ, BK, CG, HP, NB
6	Bệnh gỉ sắt	15 - 30% số			C1-C3	3,7			3,7			4,8	HL, TN, BL, HM, BĐ, BK,

STT	Tên SVGH	Mật độ sâu, tỷ lệ bệnh			Tuổi sâu, cấp bệnh phổ biến	Diện tích nhiễm (ha)			Tổng DTN (ha)	So sánh DTN		DT phòng trừ (ha)	Phân bố
		Phổ biến	Cao	Cục bộ		Nhẹ-Tb	Nặng	MT		Kỳ trước	CKNT		
		lá											CG, HP, NB, TN
	<b>Tổng cộng</b>					<b>27,4</b>			<b>27,4</b>	<b>-1,1</b>		<b>21,7</b>	

**Ghi chú viết tắt các xã, phường:** ĐT: Đông Thạnh, HM: Hóc Môn, BĐ: Bà Điểm, XTS: Xuân Thới Sơn, TMT: Trung Mỹ Tây, TTH: Tân Thới Hiệp, TA: Thới An, ANT: An Nhơn Tây, CC: Củ Chi, NĐ: Nhuận Đức, TAH: Tân An Hội, TM: Thái Mỹ, APĐ: An Phú Đông, TN: Tân Nhựt, BC: Bình Chánh, HL: Hưng Long, BH: Bình Hưng, VL: Vĩnh Lộc, TVL: Tân Vĩnh Lộc, BL: Bình Lợi, TB: Tam Bình, LT: Long Trường, LB: Long Bình, LX: Linh Xuân, TTH: Tân Thới Hiệp, TA: Thới An, HB: Hiệp Bình, TĐ: Thủ Đức,

### CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT